

# Kompleksne transformacije i M.C. Escher

---

**Kreš, Mihaela**

**Undergraduate thesis / Završni rad**


**2023**

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Rijeka / Sveučilište u Rijeci**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:196:023253>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-16**



Repository / Repozitorij:

[Repository of the University of Rijeka, Faculty of Mathematics - MATHRI Repository](#)



**Sveučilište u Rijeci – Fakultet za matematiku**

Sveučilišni preddiplomski studij matematike

Mihaela Kreš

**Kompleksne transformacije i M.C.Escher**

Završni rad

Rijeka, 2023.

**Sveučilište u Rijeci – Fakultet za matematiku**

Sveučilišni preddiplomski studij matematike

Mihaela Kreš

**Kompleksne transformacije i M.C.Escher**

Završni rad

**Mentor:** mr.sc.Ines Radošević Medvidović

Rijeka, 2023

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Uvod.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Osnovni pojmovi.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Kompleksne transformacije .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Karakterizacija konformnog preslikavanja.....</b>	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>Preslikavanje osnovnim funkcijama.....</b>	<b>9</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Translacija .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Homotetija .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Rotacija.....</b>	<b>10</b>
<b>3.2.4</b>	<b>Inverzija .....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Mobiusova transformacija .....</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Escherova djela.....</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Galerija.....</b>	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>Biografija.....</b>	<b>23</b>
<b>8</b>	<b>Zaključak .....</b>	<b>25</b>
	<b>Popis slika.....</b>	<b>26</b>
	<b>Literatura.....</b>	<b>27</b>

# 1 Uvod

U ovome radu upoznat ćemo se s konformnim preslikavanjem kao kompleksnom funkcijom kompleksne varijable, te ćemo navesti osnovna konformna preslikavanja i primjere. Nadalje, navest ćemo Möbiusovu transformaciju kao najznačajniji primjer konformnog preslikavanja i prikazati ju kao kompoziciju osnovnih konformnih preslikavanja. Möbiusova transformacija nazvana je po njemačkom matematičaru Augustu Ferdinandu Möbiusu (1790.-1860.). Također, povezat ćemo navedene matematičke pojmove s radovima nizozemskog grafičara M.C.Eschera i pokazati primjenu konformnih preslikavanja u njegovim grafikama. Na kraju rada kratko ćemo se upoznati s biografijom navedenog umjetnika i njegovim umjetničkim opusom.

## 2 Osnovni pojmovi

**Definicija 2.1.** Skup kompleksnih brojeva  $\mathbb{C}$  definiramo kao:

$$\mathbb{C} = \{z = (x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Prva komponenta  $x$  je *realni dio* kompleksnog broja  $z = (x, y) \in \mathbb{C}$  i označava se s  $\operatorname{Re}(z)$ .

Druga komponenta  $y$  je *imaginarni dio* kompleksnog broja  $z = (x, y) \in \mathbb{C}$  i označava se s  $\operatorname{Im}(z)$ .

Na  $\mathbb{C}$  definiramo operaciju *zbajanja*  $+$ :  $\mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  sa:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \text{ za } (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{C}.$$

Na  $\mathbb{C}$  definiramo operaciju *množenja*  $\cdot$ :  $\mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  sa:

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 \cdot x_2 - y_1 \cdot y_2, x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_1), \text{ za } (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{C}.$$

**Teorem 2.1**  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  je *polje* koje nazivamo polje kompleksnih brojeva.

Dokaz vidi u [4].


**Napomena 2.1** Skup  $\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{C}$  naziva se *realna os*, a skup  $\{(0, y) : y \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{C}$  naziva se *imaginarna os*.

**Definicija 2.2** *Modul* ili absolutna vrijednost kompleksnog broja  $z = (x, y)$  je realan broj:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

**Definicija 2.3** Kut  $\varphi \in [0, 2\pi)$  kojeg radijvektor točke  $z \in \mathbb{C}$  zatvara s pozitivnim smjerom realne osi naziva se *argument* kompleksnog broja  $z$  i označava sa  $\arg(z)$ .

**Napomena 2.3** Geometrijski gledano, modul  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$  kompleksnog broja  $z = (x, y)$  predstavlja njegovu udaljenost od ishodišta  $(0, 0)$  u kompleksnoj ravnini.




Slika 2.1 Geometrijski prikaz modula kompleksnog broja (vidi [2])

**Napomena 2.4** Svaki  $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  može se prikazati u *trigonometrijskom* (polarnom) *obliku*:

$$z = |z| \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$$

Uvodeći oznaku:  $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \cdot \sin \varphi$  trigonometrijski oblik kompleksnog broja postaje eksponencijalni oblik:  $z = |z| \cdot e^{i\varphi}$ .



Slika 2 2 Trigonometrijski prikaz kompleksnog broja (vidi[2])

**Definicija 2.4** Konjugirano kompleksni broj  $\bar{z}$  kompleksnog broja  $z = (x, y)$ , je broj:

$$\bar{z} = (x, -y) \in \mathbb{C}.$$

Konjugiranje kompleksnih brojeva tj. funkciju  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(x, y) = (x, -y)$ , možemo geometrijski interpretirati kao zrcaljenje kompleksne ravnine s obzirom na realnu os.


# 3 Kompleksne transformacije

## 3.1 Karakterizacija konformnog preslikavanja

**Definicija 3.1** Neka je  $f: D \rightarrow K$  preslikavanje. Kažemo da je  $f$  *kompleksna funkcija* ako je  $K = \mathbb{C}$ , te je  $f$  *funkcija kompleksne varijable* ako je  $D \subseteq \mathbb{C}$ .

Neka je preslikavanje kompleksna funkcija  $w = f(z) = (u, v)$  dana s funkcijama  $u, v: D \rightarrow \mathbb{R}$  gdje je  $z = (x, y) \in \mathbb{C}, D \subset \mathbb{R}^2$  te  $u = u(x, y), v = v(x, y)$ . Pri tome se kompleksni broj  $z = (x, y) \in \mathbb{C}$  u kompleksnoj  $z$ -ravnini identificira s točkom  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  u  $xy$ -ravnini.

**Definicija 3.2** Neka je zadano preslikavanje  $u = u(x, y), v = v(x, y)$  koje točku  $(x_0, y_0)$  iz  $(x, y)$ -ravnine preslika u  $(u_0, v_0)$  u  $(u, v)$ -ravnini, a krivulje  $C_1$  i  $C_2$  koje se sijeku u  $(x_0, y_0)$  preslika u  $C'_1, C'_2$  koje se sijeku u  $(u_0, v_0)$ . Ako je kut  $\alpha$  između krivulja  $C_1$  i  $C_2$  jednak kutu  $\alpha'$  između krivulja  $C'_1, C'_2$  po iznosu i smjeru onda je *preslikavanje f konformno u točki  $(x_0, y_0)$* .



Slika 3.1 Očuvanje kutova pri konformnom preslikavanju (vidi [2])

**Definicija 3.3** Za funkciju  $f: D \rightarrow \mathbb{C}$  kažemo da je *diferencijabilna u točki  $z_0$*  otvorenog skupa<sup>1</sup>  $D \subseteq \mathbb{C}$ , ako funkcija

$$z \rightarrow \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

ima limes u točki  $z_0$ . Tada se taj limes označava sa  $f'(z_0)$  i naziva se derivacija funkcije  $f$  u točki  $z_0$ . Slijedi,

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

<sup>1</sup> Skup  $\Omega \subseteq \mathbb{C}$  je otvoren ako:  $(\forall z \in \Omega)(\exists r_z > 0)(K(z, r_z) \subseteq \Omega)$

**Definicija 3.4** Ako je funkcija  $f': D \rightarrow \mathbb{C}$  neprekidna na  $D \subseteq \mathbb{C}$  onda je  $f$  derivabilna funkcija na  $D$ .

**Definicija 3.5** Neka je  $D \subseteq \mathbb{C}$  i  $f$  derivabilna funkcija. Preslikavanje  $f: D \rightarrow \mathbb{C}$  naziva se konformno preslikavanje ako čuva veličinu i orijentaciju kutova.

**Definicija 3.6** Neka je funkcija  $f: D \rightarrow \mathbb{C}$  derivabilna na  $D \subset \mathbb{C}$  te neka je  $f'(z_0) \neq 0$  u točki  $z_0 \in D$ . Tada je preslikavanje  $w = f(z)$  konformno u točki  $z_0$ .

**Napomena 3.1** Neka je funkcija  $f: D \rightarrow \mathbb{C}$  derivabilna na  $D \subset \mathbb{C}$  te neka je  $f'(z) \neq 0$  na području  $D$ . Tada je preslikavanje  $w = f(z)$  konformno u svim točkama područja  $D$ .

### Primjer 3.1

a) Preslikavanje  $f(z) = z^n, n = 2, 3, \dots$  je konformno na  $\mathbb{C}$  osim u točki  $z_0 = 0$ .

Deriviranjem zadane funkcije dobivamo uvjet  $f'(z) = nz^{n-1} \neq 0$ .

Zaključujemo da je preslikavanje konformno za  $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ .

b) Preslikavanje  $f(z) = \cos z$  je konformno na  $\mathbb{C} \setminus \{k\pi\}, k \in \mathbb{Z}$ .

Deriviranjem zadane funkcije dobivamo uvjet  $f'(z) = -\sin z \neq 0$ .

Zaključujemo da je preslikavanje konformno za  $z \in \mathbb{C} \setminus \{k\pi\}, k \in \mathbb{Z}$ .

c) Preslikavanje  $f(z) = \frac{z+2}{z-2}$  je konformno na  $\mathbb{C} \setminus \{2\}$ .

Deriviranjem zadane funkcije dobivamo uvjet  $f'(z) = \frac{z-2-(z+2)}{(z-2)^2} = \frac{-4}{(z-2)^2} \neq 0$ .

Zaključujemo da je preslikavanje konformno za  $z \in \mathbb{C} \setminus \{2\}$ .

d) Preslikavanje  $f(z) = e^z$  je konformno na  $\mathbb{C}$ .

Deriviranjem zadane funkcije dobivamo uvjet  $f'(z) = e^z \neq 0$ .

Zaključujemo da je preslikavanje konformno za  $\forall z \in \mathbb{C}$ .


## 3.2 Preslikavanje osnovnim funkcijama

U ovom ćemo poglavlju navesti neka osnovna konformna preslikavanja. Složenija konformna preslikavanja dobivaju se kompozicijom osnovnih. Svaka kompozicija konformnih preslikavanja također je konformno preslikavanje.

### 3.2.1 Translacija

Najjednostavnije konformno preslikavanje je *translacija*. Translacija je transformacija oblika

$$f_1(z) = z + b, \quad b \in \mathbb{C}.$$





Uočimo kako se translacijom svaka točka kompleksne ravnine preslika u novu točku kompleksne ravnine pomaknuta za vektor  $b$ .

### 3.2.2 Homotetija



Složenje konformno preslikavanje oblika  $f_2(z) = kz, k \in \mathbb{R}^+$  naziva se *homotetija*. Ovo preslikavanje svaku točku preslika u točku pri čemu argument kompleksnog broja ostaje sačuvan, a apsolutna vrijednost kompleksnog broja se poveća ili smanji u ovisnosti o  $k$ . Dakle, homotetija je zajednički naziv za kontrakciju i dilataciju odnosno stezanje i rastezanje. Pogledajmo slučajeve kada je  $k < 1$  i  $k > 1$ .

**$k < 1$ :**



Uočavamo da za  $k < 1$  imamo kontrakciju odnosno stezanje.

**$k > 1$ :**




Uočimo da za  $k > 1$  imamo dilataciju odnosno rastezanje.

Ovo preslikavanje svaku točku preslika u točku pri čemu su kutovi sačuvani (*konformno preslikavanje*) a absolutna vrijednost  $|z_0|$  se poveća, odnosno, smanji  $k$  puta.


### 3.2.3 Rotacija

Preslikavanje oblika  $f_3(z) = e^{i\theta}z$  nazivamo *rotacija*. Ako ga prikažemo u trigonometrijskom obliku dobivamo  $f_3(z) = (\cos \theta, \sin \theta)z$ . Odnosno za  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$  dobivamo

$$f_3(z) = r(\cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi))$$



Ovim se preslikavanjem svaka točka kompleksne ravnine zarotira za kut  $\varphi$  u pozitivnom smjeru.



Slika 3 1 Slika (b) je rotacija slike (a) za  $-\pi/4$ , a slika (c) je rotacija slike (a) za  $-\pi/2$ , (vidi [I])

### 3.2.4 Inverzija

Inverzija je preslikavanje oblika  $f_4(z) = \frac{1}{z}$ ,  $z \in \mathbb{C}$ ,  $z \neq 0$ . Definiramo preslikavanje na proširenoj kompleksnoj ravnini odnosno dodajemo točku  $\infty$ , pa vrijedi

$$f_4(\infty) = \frac{1}{\infty} = 0, \quad f_4(0) = \frac{1}{0} = \infty.$$


Kako bi shvatili na koji način preslikava inverzija, pogledajmo simetriju s obzirom na jediničnu kružnicu.

#### 3.2.3.1 Simetrija obzirom na jediničnu kružnicu

Kompleksni brojevi  $z_1$  i  $z_2$  su simetrični s obzirom na jediničnu kružnicu ako vrijedi


$$\arg(z_1) = \arg(z_2) \quad \text{i} \quad |z_1||z_2| = 1.$$

Želimo pronaći  $z_2$  koji je simetričan broju  $z_1$  s obzirom na jediničnu kružnicu; vidi skicu.




Kako mora vrijediti  $\arg(z_1) = \arg(z_2)$ , uočavamo da će se kompleksan broj  $z_2$  nalaziti na označenom polupravcu.

$$(\varphi_1 = \varphi_2)$$



Prvo konstruiramo tangentu na jediničnu kružnicu iz  $z_1$  i dobivamo točku A. Spojimo točku A i ishodište, te dobivamo pravi kut pri vrhu A (linije crvene boje).



Spuštamo visinu iz točke A na polupravac, na kojem se nalazi  $z_1$ . Nožište te visine na polupravcu je traženi kompleksni broj  $z_2$ .

Iz sličnosti trokuta vrijedi  $1: |z_2| = |z_1|: 1$ , odnosno  $\frac{1}{|z_2|} = \frac{|z_1|}{1}$ , čime je zadovoljen uvjet  $|z_1||z_2| = 1$ .

Kako je ovo povezano s inverzijom?

Iz konstrukcije smo dobili  $z_2 = \frac{1}{\bar{z}_1}$ . S obzirom da vrijedi  $|\bar{z}_1| = |z_1|$  imamo


$$\arg(z_2) = \arg\left(\frac{1}{\bar{z}_1}\right) = -\arg(\bar{z}_1) = -(-\arg(z_1)) = \arg(z_1)$$

odnosno zadovoljen je uvjet  $\arg(z_1) = \arg(z_2)$ .

Kod inverzije potrebno je dobiti oblik  $z_2 = \frac{1}{z_1}$ .

Inverziju možemo prikazati kao kompoziciju dva preslikavanja, inverzije s obzirom na jediničnu kružnicu (gdje dobivamo  $\frac{1}{z_1}$ ) i simetrije s obzirom na realnu os.

Promotrimo gdje bi se trebala nalaziti točka  $\frac{1}{z_1}$ , kad točku  $z_1$  preslikamo inverzijom. Točka simetrična  $z_2$  s obzirom na os. Dakle, djelovanje inverzije je osna simetrija točke s obzirom na realnu os i potom dilatacija.



## 4 Möbiusova transformacija

Jedan od najznačajnijih primjera konformnog preslikavanja je bilinearno preslikavanje<sup>2</sup> ili Möbiusova transformacija.

**Definicija 4.1** Neka su zadane konstante  $a, b, c, d \in \mathbb{C}$  takve da je  $ad - bc \neq 0$ . *Möbiusova transformacija* je racionalna funkcija kompleksne varijable  $f: \mathbb{C} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\} \rightarrow \mathbb{C}$  definirana sa:

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Möbiusova transformacija definirana je kao kvocijent dviju derivabilnih bijekcija, pa je i početna funkcija derivabilna na svojoj domeni.

Dakle,

$$f'(z) = \frac{a(cz + d) - c(az + b)}{(cz + d)^2} = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} \neq 0$$

pa bi  $ad - bc = 0$  povlačilo da je  $f$  konstanta. Iz tog razloga je stavljen uvjet  $ad - bc \neq 0$ .

Budući da je funkcija derivabilna sa svojstvom  $f'(z) \neq 0$  zaključujemo da je i konformna funkcija.

Ranije smo naveli da se složenija konformna preslikavanja mogu prikazati kao kompozicija osnovnih. U nastavku ćemo Möbiusova transformacija prikazat na taj način

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{\frac{bc - ad}{c^2}}{z + \frac{d}{c}}.$$

Neka su

$$f_1(z) = z + \frac{d}{c}, \text{ translacija za } \frac{d}{c},$$

$$f_2(z) = \frac{1}{z}, \text{ inverzija,}$$

---

<sup>2</sup> Möbiusova transformacija ili bilinearna transformacija jer se može prikazati i jednadžbom  $czf(z) - az + df(z) - b = 0$ , gdje se vidi da je to linearna funkcija posebno po  $z$  i posebno po  $f(z)$ .

$$f_3(z) = \frac{bc-ad}{c^2}z, \text{ dilatacija i rotacija,}$$

$$f_4(z) = z + \frac{a}{c}, \text{ translacija za } \frac{a}{c}.$$

Sada  $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$  možemo prikazati kao kompoziciju  $f(z) = (f_4 \circ f_3 \circ f_2 \circ f_1)(z)$ .

### Primjer 4.1

- a) Funkcija zadana sa  $f(z) = \frac{(3+i)z+2}{z+3i}$  je Möbiusova transformacija.

Da bi navedena funkcija bila Möbiusova transformacija potrebno je provjeriti zadovoljavaju li konstante  $a, b, c, d \in \mathbb{C}$  uvjet  $ad - bc \neq 0$ , pri čemu je  $a = 3 + i$ ,  $b = 2$ ,  $c = 1$ ,  $d = 3i$ .

$(3+i)3i - 2 = 9i - 5 \neq 0$ . Dakle, funkcija je Möbiusova transformacija.

- b) Rastavimo Möbiusovu transformaciju  $f(z) = \frac{2iz+3i}{2z+2}$  na osnovna konformna preslikavanja.

$$f(z) = \frac{2iz+3i}{2z+2} = \frac{2z+3}{2z+2}i = \frac{2z+2+1}{2z+2}i = i + \frac{i}{2z+2}$$

Neka je  $f_1(z) = 2z$  homotetija za faktor 2,  $f_2(z) = z + 2$  translacija za 2,  $f_3(z) = \frac{1}{z}$

inverzija,  $f_4(z) = e^{i\frac{\pi}{2}}z$  rotacija za kut  $\frac{\pi}{2}$  i  $f_5(z) = z + i$  translacija za  $i$ . Tada je  $f(z) = (f_5 \circ f_4 \circ f_3 \circ f_2 \circ f_1)(z)$ .

## 5 Escherova djela

U nastavku ćemo promatrati umjetnička djela nizozemskog grafičara M.C.Eshera te na njima primijeniti navedena preslikavanja.



Slika 6 1 Regular Division of The Plane VI


Zbog jednostavnosti i jasnoće smatrat ćemo da je svaki gmaz jednakokračan pravokutan trokut s glavom u jednom od kutova veličine  $45$  stupnjeva i rep u drugom. Uočavamo da na kraćim stranicama strši jedna šapa, a na hipotenuzi dvije.



Spajanje navedenih trokuta može se podijeliti u tri kategorije:


- 1) Spajanje trokuta preko dvije hipotenuze.
- 2) Spajanje trokuta preko dvije katete.
- 3) Spajanje trokuta preko hipotenuze i katete.

1)




Kompozicija  
rotacije i  
translacije.

2)




Kompozicija  
rotacije i  
translacije.

3)




Kompozicija  
rotacije, translacije i  
kontrakcije.

Situacije prikazane u nastavku nisu dozvoljene za spajanje dvaju trokuta, a to su:




Na prvoj slici oblik označen plavom bojom sadrži glavu ili rep gmaza dok njemu susjedan pravi kut sadrži lakat. Budući da negativan prostor lakta može biti ispunjen samo drugim laktom, a negativan prostor glave ili repa može biti ispunjen samo repom, odnosno glavom, uočavamo da ova dva kuta ne mogu biti susjedna. Isti argument vrijedi i za preostale dvije slike. Odavde vidimo da imamo samo tri načina za spajanje trokuta kako bi napravili pravilna podudaranja (gore navedena).




*Slika 6.2 House of stairs*


Kao i kod prethodne slike, i na ovoj je vidljiva matematička pozadina. Naime, ako jedne stepenice fiksiramo, ostale dobivamo određenim preslikavanjima.



Zaokružene stepenice uzet ćemo kao fiksne te ćemo raspored ostalih stepenica promatrati u odnosu na fiksne.



Kompozicija translacije i kontrakcije.




Kompozicija translacije i rotacije.



Slika 6 3 Circle limit I

Navedenim umjetničkim djelom nizozemski je grafičar želio prikazati beskonačnost u konačnom prostoru. Kako bi bolje uočili način na koji je Escher stvorio sliku, pogledajmo linije koje prate bodlje ribe. Imamo dvije vrste linija a to su ravne linije koje prolaze središtem diskova lukovi krugova koji dodiruju rub diska. Uočavamo da imamo poligone čijom translacijom i rotacijom dobivamo cijelu ravninu.




Escher nije bio zadovoljan ovim djelom obzirom da ribe nisu okrenute u istom smjeru te ne izgledaju realistično.

U djelu Circle limit III ribe su bolje organizirane te se boje pravilno izmjenjuju.




Slika 6.4 Circle limit II

## 6 Galerija



Slika 6 5 Relativity




Slika 6 6 Day and night



Slika 6 7 Print Gallery (nedovršena)



Slika 6 8 Print Gallery (dovršena)



Slika 6 9 Drawing hands




Slika 6 10 The well



Slika 6 11 Waterfall



Slika 6 12 Möbius strip II



Slika 6 13 Atrani



Slika 6 14 Castrovalva


## 7 Biografija

*Maurits Cornelis Escher* jedan je od najpoznatijih svjetskih grafičara. Ljudi su ga često nazivali majstorom simetrije, nizozemskim ilustratorom i matematičarem, te specijalistom za optičku umjetnost. Svojim djelima i u njima poigravajući se orijentacijom i prostorom inspirirao je milijune ljudi diljem svijeta.

Rođen je u nizozemskom gradu Leeuwardenu 1898. godine kao četvrti sin građevinskih inženjera Georgea Arnolda Eschera i Sare Gleichman. Nakon pet godina obitelj se seli u grad Arnfern gdje Escher provodi većinu svoje mladosti. Bio je vrlo kreativno dijete s puno interesa, pri čemu ga je posebno privlačila glazba, a i stolarski zanati. Iako pod utjecajem oca inženjera, nije se posebno isticao u matematici. Školu arhitekture i dekorativne umjetnosti pohađao je od 1919. do 1922. godine gdje je razvio interes za grafiku i gdje je pod mentorstvom Samuela Jessurun de Mosquita izradio svoja prva djela u drvorezu.


Proveo je niz godina putujući diljem Europe, te je živio u Italiji od 1922. do 1935., a zatim se preselio u Švicarsku, a potom u Belgiju. Talijanska arhitektura i krajolik potakla ga je na stvaranje realnijih obrazaca u kojima se poigrava perspektivom i sjenama. U tom razdoblju nastaju djela „*Hand with a reflecting sphere*“, „*Castrovalva*“ i „*Atrani*“. Često je odlazio u Španjolsku gdje ga je očaravao kompleksan dizajn i arhitektura. Metode ponavljanja određenih elemenata kao i međusobna preklapanja slika i figura vidljiva su u njegovim serijama radova „*Metamorphosis*“ i „*Development*“. Tijekom života Escher je izradio 448 litografija i drvoreza, te više od 2000 crteža i skica. Kroz svoja je djela pokazao izvanrednu sposobnost prikazivanja nemogućih arhitektonskih konstrukcija, beskonačnih prostora, te metamorfozu jednog predmeta u drugi.

Umro je 1972. godine u svom domu. Njegovi se radovi nalaze po cijelom svijetu: u Nacionalnoj umjetničkoj galeriji (Washington DC), u javnoj knjižnici u Bostonu, u muzeju Escher (Haag), u Huis ten Bosch (Japan), u muzeju Izraela (Jeruzalem), te u Nacionalnoj galeriji Kanade (Ottawa).




Slika 7 1 Maurits Cornelis Escher


U nastavku se nalaze neki od njegovih citata:




Slika 7 2 Citat I



Slika 7 3 Citat II



BrainyQuote®  
Slika 7 4 Citat III



BrainyQuote®  
Slika 7 5 Citat IV

## 8 Zaključak

Primjenom kompleksnih transformacija možemo shvatiti matematičku pozadinu nekih Escherovih djela i time ih doživjeti još ljepšima i sadržajnijima. U nekim je svojim radovima prikazao popločavanja ravnine različitim oblicima primjenom različitih načina preklapanja i ponavljanja tih oblika, a uvijek s prisutnom simetrijom i pravilnim uzorcima. Iako nije posjedovao matematičko obrazovanje, na njega su utjecali matematičari George Pólya i Roger Penrose, te u njegovim radovima prepoznajemo i beskonačnost, involuciju, dualnost te euklidsku i hiperboličku geometriju.

# Popis slika

Slika 2 1 Geometrijski prikaz modula kompleksnog broja .....	5
Slika 2 2 Trigonometrijski prikaz kompleksnog broja .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Slika 3 1 Očuvanje kutova pri konformnom preslikavanju.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Slika 3 2 Slika (b) je rotacija slike (a) za- $-\pi/4$ , a slika (c) je rotacija slike (a) za $-\pi/2$ . ....	11
Slika 6 1 Regular Division of The Plane VI.....	16
Slika 6 2 House of stairs.....	18
Slika 6 3 Circle limit I .....	19
Slika 6 4 Circle limit III .....	20
Slika 6 5 Relativity .....	21
Slika 6 6 Day and night .....	21
Slika 6 7 Print Gallery (nedovršena) .....	21
Slika 6 8 Print Gallery (dovršena) .....	21
Slika 6 9 Drawing hands .....	22
Slika 6 10 The well.....	22
Slika 6 11 Waterfall.....	22
Slika 6 12 Möbius strip II.....	22
Slika 6 13 Atrani.....	22
Slika 6 14 Castrovalva.....	22
Slika 7 1 Maurits Cornelis Escher .....	24
Slika 7 3 Citat I.....	24
Slika 7 4 Citat II .....	24
Slika 7 5 Citat III.....	24
Slika 7 6 Citat IV.....	24

# Literatura

1. Batisić, I., Uporaba konformnog preslikavanja u problemima strujanja idealne tekućine, PMF - fizički odjel, Sveučilište u Zagrebu, 2008.
2. Čuljak, V., Primijenjena matematika, Skripta, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2011.
3. Devide, V., Matematička čitanka, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
4. Kurepa, S., Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb, 1967.
5. Pavković, B., Veljan, D., Elementarna matematika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
6. Ungar, Šime, Kompleksna analiza, Skripta, PMF-matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu, 2009.
7. Augustyn, A., *M.C. Escher / Biography, Facts, & Tessellation / Britannica*, URL: <https://www.britannica.com/biography/M-C-Escher> (21.3.2023.)
8. *Biography; M.C. Escher; The Official Website*, URL: <https://mcescher.com/about/biography/> (29.5.2023.)
9. *M. C. Escher biografija - djetinjstvo, životna dostignuća i vremenska traka*, URL: <https://hr.celeb-true.com/escher-legendary-dutch-graphic-artist-illustrator-this-biography> (20.3.2023.)
10. *M. C. Escher quote: I never got a pass mark in math... Just imagine...*, URL: <https://www.azquotes.com/quote/919286> (6.6.2023.)
11. *M. C. Escher Quotes – BrainyQuote*, URL: <https://www.brainyquote.com/authors/m-c-escher-quotes> (2.6.2023.)
12. *The Mathematical Art of M.C.Escher*, URL: <https://platonicrealms.com/minitexts/Mathematical-Art-Of-M-C-Escher> (6.6.2023.)